

# 오크라

**햇빛 세기:** 일조량이 풍부한 맑은 날에 심습니다(6~8시간 직사광선을 받는 곳이어야 함). 9~12 인치 간격으로 나란히 심어야 하며, 버킷에 심는다면 5~7gal. 부피 버킷당 1그루가 적당합니다. 서리철이 지난 후인 4 월~7 월에 심으세요.

**토양 상태:** 유기물을 섞어 물 빠짐이 좋게 합니다. 개량되지 않은 모래나 중점토에 심지 않도록 합니다. 토양 검사를 실시했고 산도(pH)가 6.2 미만으로 나왔다면, 이른 봄에 석회질 비료를 권장량만큼 뿌려줍니다.

버킷 텃밭의 물 빠짐을 좋게 하려면 분갈이 배합토를 사용하고 버킷에 배수 구멍을 뚫어야 합니다. 자체적인 물주기 기능이 있는 화분도 좋습니다.

**물 주기:** 토양의 수분을 일정하게 유지하되, 수분이 너무 많아서도 안 됩니다. 매주 1~2인치 깊이 정도로 물을 주고, 무더운 여름날에는 물을 더 줍니다. 잎이 건조해야 곰팡이병을 예방할 수 있습니다. 멀칭을 하면 수분 유지에 도움이 됩니다.

**심기:** 1인치 깊이로 구덩이를 파서 12인치 간격으로 씨를 심습니다. 우선 실내나 비닐하우스에서 싹을 틔워 6~8주간 키운 다음, 1주간 실외에 내놓아 외부 환경에서 서서히 적응시킨 후 텃밭에 옮겨 심습니다. 잎이 3~4개 나면 옮겨심기 합니다. 모종을 구매해서 심는 경우, 색깔이 선명하고 튼튼하게 보이는 것으로 고릅니다. 꽃이나 과실이 달린 모종은 피하도록 합니다. 분형근 (root ball) 이 완전하  
옆일 정도의 깊이 구덩이를 팝니다. 흙을 두드려서 모종을 단단히 고정시키고 물을 흠뻑 줍니다.

**비료 주기:** 토양 검사를 하지 않을 경우, 모종을 심으면서 복합비료 (all-purpose fertilizer, 8-8-8 또는 10-10-10 혼합비율)를 제품 표기량에 맞게 뿌려줍니다. 첫 꼬투리를 수확한 후, 반경 4~6 인치 떨어진 지점에 복합비료를 다시 뿌려줍니다.

**병충해 및 잡초 관리:** 병충해 관리를 자주 해 줘야 생리장해를 막을 수 있습니다. 살충 비누 (insecticidal soap (연조식 곤충용)) 또는 분말 또는 스프레이 형태의 BT제 (애벌레 등 해충 방지에 효과적인 농약)를 사용하고, 주요 병해 방제를 위해 살진균제를 뿌려주세요. 제품 설명문을 항상 준수해야 합니다. 멀칭을 하면 잡초와 병충해를 방지할 수 있습니다.

**수확:** 아주심기 후 45~55 일 사이에 수확이 가능하며, 품종에 따라 수확 시기가 다릅니다.

**그 외 정보:** 미니 품종은 가시가 없는 경우가 많으며, 텃밭 공간을 크게 차지하지 않습니다. 미니 품종을 버킷에서 기르면 식물이 쓰러질 가능성이 적습니다. 씨를 심기 6시간 전에 미리 물에 담가놓으면 싹을 더 잘 틔웁니다. 꼬투리가 2~4 인치쯤 자랐을 때 수확하고 그 이후에는 2~3 일에 한 번씩 수확합니다. 더 자세한 정보는 **[www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore)** 에서 확인하세요.

그로우  
모어  
기브모어

알라배마 A&M 대학교와 오번 대학교의 앨라배마 코퍼러티브 익스텐션 시스템 (Alabama Cooperative Extension System) 은 동등한 기회를 실현하는 교육기관이자 고용기관입니다. 모든 이용자를 환영합니다. 웹 접근성 관련 필요한 사항이 있다면 문의해 주시기 바랍니다.

© 2022 년 앨라배마 코퍼러티브 익스텐션 시스템. 관련 소유: [www.aces.edu](http://www.aces.edu) ANR-2876-A

**[www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore)**

**extension**  
ALABAMA A&M & AUBURN UNIVERSITIES

이곳에 스캔하세요

