


秋葵



阳光：种在阳光充足的地方（每天日照有 6 到 8 小时）。植苗在每行内要间隔 9 至 12 英寸，或在一个 5 至 7 加仑大小的盆中种植 1 棵苗。从四月到七月在所有霜危害过去后种植。

土壤：用有机物改良土壤，打造出排水性良好的土壤。避免在未改良的沙土或重粘土土壤中种植。如果土壤测试结果示 pH 低于 6.2，在早春按建议的方式加石灰。

在盆栽菜园中，使用花盆用土并确保每个花盆都有排水孔，以便保持良好的排水情况。您也可以使用自吸水盆。

水：土壤一直保持湿润但不要太潮湿。每周浇 1-2 英寸的水，并且在炎热的夏季多一些。避免把叶子打湿，以便防止真菌病。覆盖物有助于保持水分。

种植：直接把种子播种在 1 英寸深且相距 12 英寸。在室内，在种植前 6-8 周育苗，并且在种到园中去前一周育苗适应室外环境。在长出 3-4 片叶子后进行移栽。如果您用于移栽的苗，看上去颜色健康并且植株茁壮的苗。不要挑有花或果实的苗。挖一个和根一样深的洞来种苗。把土拍实，并且把水浇透。

种植
越多
给予越多

www.aces.edu/go/growmore

施肥：如果您没有做土壤测试，请在种植时根据标签上的说明施用通用肥料（8-8-8 或 10-10-10）。采摘第一批秋葵后，距离茎 4-6 英寸在植株旁（施肥料）进行追肥。

昆虫/疾病/杂草：常时植物有无受到虫害或疾病的影响。用虫皂（杀死昆虫）或 Bt 粉或杀真菌剂（杀毛毛虫，也称“蠕虫”）。常时洒菌剂，以便控制常时的真菌病。每次都遵照标签上的说明。土壤覆盖物能抑制杂草及疾病。

收割：第 45-55 天可进行采摘。采摘的时机因秋葵的种类不同而异。

其他：矮种秋葵通常是无骨品种，占用的菜园空间少。在花盆中种矮种秋葵，植株不易倒伏。选了种子更好地发芽，在播种前浸泡种子 6 小时。在秋葵长到 2-4 英寸可采摘，且可每隔 2 天或 3 天持续采摘。访问 www.aces.edu/go/growmore 来了解更多信息。

种植
越多
给予越多

阿拉巴马州合作推广系统（阿拉巴马州理工大学和奥本大学）是机会均等的教育机构和雇主。我们欢迎每一个人！如果您有任何障碍通行需求，请告知我们。

© 2022 年阿拉巴马州合作推广系统版权所有。保留所有权利。www.aces.edu ANR-2876-A

www.aces.edu/go/growmore

extension
ALABAMA A&M & AUBURN UNIVERSITIES

在框里扫描

