



# Frijoles (de arbusto y trepadores)

**Sol:** Siembre donde las semillas tengan luz directa del sol (de 6 a 8 horas). Separe los frijoles de arbusto de 2 a 4 pulgadas y los trepadores de 6 a 8 pulgadas a lo largo de hileras o coloque de 3 a 4 plantas por contenedor de 2,5 galones. Siembre de abril a julio, después de que haya pasado cualquier peligro de helada.

**Suelo:** Acondicione con materia orgánica para crear un suelo bien drenado. Evite sembrar en suelo arenoso o muy arcilloso sin haberlo acondicionado. Si el análisis del suelo muestra que el pH es inferior a 6,2, aplique cal al comienzo de la primavera y según las recomendaciones.

Para lograr un drenaje adecuado, si cultiva en contenedores, utilice una mezcla para macetas y asegúrese de que los recipientes tengan agujeros de drenaje. También puede utilizar contenedores con autorriego.

**Agua:** Mantenga la tierra constantemente húmeda pero no saturada. Aplique entre 1 y 2 pulgadas de agua por semana y un poco más durante los días calurosos de verano. Mantenga las hojas secas para evitar enfermedades fúngicas. El mantillo ayuda a retener la humedad.

**Cultivo:** Siembre las semillas a aproximadamente 1 pulgada de profundidad. Cuando los brotes tengan entre 2 y 3 pulgadas de altura, entresaque plantas de frijoles de arbusto para lograr una separación de entre 2 y 3 pulgadas y entresaque plantas de frijoles trepadores para lograr una separación de entre 4 y 6 pulgadas. Los frijoles no darán frutos si se encuentran encimados. No se recomienda trasplantar.

**Fertilizante:** Si no cuenta con un análisis del suelo, aplique un fertilizante multiuso (8-8-8 o 10-10-10) al momento de la siembra y según las indicaciones de la etiqueta. Vuelva a aplicarlo a un costado de la planta, a una distancia de entre 4 y 6 pulgadas del tallo (chorreado), durante la etapa de crecimiento de las hojas (etapa 3 a 4) y antes de la primera floración.

**Insectos/Enfermedades/Maleza:** Explore las plantas con frecuencia en busca de daños causados por insectos y enfermedades. Utilice jabón insecticida para los insectos de cuerpo blando o polvo o spray Bt para las orugas, también conocidas como "gusanos". Rocíe fungicida con frecuencia para eliminar las enfermedades fúngicas más comunes. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta. El mantillo inhibe las malas hierbas y las enfermedades.

**Cosecha:** Coseche los frijoles de arbusto entre los 55 y los 65 días y los frijoles trepadores entre los 70 y los 80 días. El tiempo de cosecha dependerá de la variedad.

**Otros:** Los frijoles de arbusto se sostienen por sí mismos y crecen solo un par de pies de altura, por lo que no necesitan ningún tipo de enrejado. Sin embargo, los frijoles trepadores crecen mucho más y requieren apoyo. La siembra de sucesión cada 2 o 3 semanas producirá una mayor cosecha de ambos tipos de plantas. Visite [www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore) para saber más.

ESCANEAR AQUÍ



**CULTIVE  
MÁS  
DONE MÁS**

El Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama (Universidad A&M de Alabama y Universidad de Auburn) es educador y empleador que promueve la igualdad de oportunidades. ¡Son todos bienvenidos! Por favor, informenos si tiene requerimientos de accesibilidad.

© 2022 por el Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama. Todos los derechos reservados. [www.aces.edu](http://www.aces.edu) ANR-2876-B

[www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore)

**extension**  
ALABAMA A&M & AUBURN UNIVERSITIES