



## 豆类(矮豆角(Bush)和蔓豆角(Pole))

**阳光:** 种在阳光充足的地方(每天日照有 6 到 8 小时)。在每行矮豆角苗间隔 2-4 英寸, 蔓豆角苗间隔 6-8 英寸。或在每个 2.5 加仑的盆中种 3-4 棵苗。从四月到七月在所有霜危害过去后种植。

**土壤:** 用有机物改良土壤, 打造出排水性良好的土壤。避免在未改良的沙土或重粘土土壤中种植。如果土壤测试显示 pH 低于 6.2, 在早春并根据建议加石灰。

在盆栽菜园中, 使用花盆用土并确保每个花盆都有排水孔, 以便保持良好的排水情况。您也可以使用自吸水盆。

**水:** 土壤一直保持湿润但不要太潮湿。每周浇 1-2 英寸的水, 并且在炎热的夏季多一些。避免把叶子打湿, 以便防止真菌病。覆盖物有助于保持水分。

**植物:** 直接把种子播在 1 英寸深。当苗长到 2 到 3 英寸高时进行间苗, 矮豆角苗间隔 2-3 英寸, 蔓豆角苗间隔 4-6 英寸。如果豆苗长得太密, 就不出豆来。不建议移栽。

种植  
越多  
予越多

[www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore)

**种植:** 如果您没有做土壤测试, 请在种植前并根据测试上的说明施用通用肥料 (8-8-8 或 10-10-10)。在有 3-4 片叶子、第一朵花开前在距离茎 4-6 英寸在植株旁(施肥料)进行追肥。

**昆虫/疾病/杂草:** 经常检查植物有无受到虫害或疾病的影响。用杀虫皂(针对身体昆虫)或 Bt 粉或咪唑啉(针对毛毛虫, 也称“蠕虫”)。经常洒菌药, 以便控制常见的真菌病。每次都遵照测试上的说明。土壤覆盖物能抑制杂草及疾病。

**收割:** 矮豆角在 55-65 天后可采摘, 蔓豆角在 70-80 后可采摘。收割的时机因豆的种类不同而异。

**其他:** 矮豆角自己会直立生长且只会长到几英尺高, 因此不需要藤架。但是, 蔓豆角会长得大很多, 需要支撑。两种豆类都可以每隔 2-3 周进行接力种植, 以便长得更高产量。  
访问 [www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore) 来了解更多信息。

种植  
越多  
给予越多

阿拉巴马州合作推广系统(阿拉巴马州理工大学和奥本大学)是机会均等的教育机构和雇主。欢迎每一个人!如果您有任何疑问或需求, 请告诉我。  
© 2022 年阿拉巴马州合作推广系统版权所有。保留所有权利。www.aces.edu ANR-2876-B

[www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore)

**extension**  
ALABAMA A&M & AUBURN UNIVERSITIES

在框里扫描

