

여름호박



햇빛 세기: 일조량이 풍부한 맑은 날에 심습니다(6~8시간 직사광선을 받는 곳이어야 함). 15~24인치 간격으로 나란히 심어야 하며, 버킷에 심는다면 5~7gal. 부피버킷당 1그루가 적당합니다. 서리철이 지난 후인 4월~7월에 심으세요.

토양상태: 유기물을 섞어 물 빠짐이 좋게 합니다. 개량되지 않은 모래나 중점토에 심지 않도록 합니다. 토양 검사를 실시했고 산도(pH)가 6.2 미만으로 나왔다면, 이른 봄에 석회질 비료를 권장량만큼 뿌려줍니다. 산도가 6.2를 초과했다면, 산성화된 토양을 중화시키는 칼슘비료(예: 집섬)를 뿌려줍니다. 배꼽썩음병을 막으려면 1그루당 집섬 ¼컵을 뿌립니다.

버킷 텃밭에서 키우는 경우, 버킷당 집섬 ¼컵입니다. 물 빠짐을 좋게 하려면 분갈이 배합토를 사용하고 버킷에 배수 구멍을 뚫어야 합니다. 자체적인 물주기 기능이 있는 화분도 좋습니다.

물 주기: 토양의 수분을 일정하게 유지하되, 수분이 너무 많아서도 안됩니다. 매주 1~2인치 깊이 정도로 물을 주고, 무더운 여름날에는 물을 더 줍니다. 잎이 건조해야 곰팡이병을 예방할 수 있습니다. 멀칭을 하면 수분 유지에 도움이 됩니다.

심기: 1인치 깊이로 구덩이를 파서 24인치 간격으로 씨를 심습니다. 새싹이 4~5인치 높이로 자라면, 12인치 간격으로 심습니다. 간격을 좁게 심으면 잘 자라지 못하고 열매도 부실해집니다. 옮겨심기는 권장하지 않습니다.

그로우
모어

기브모어

www.aces.edu/go/growmore

비료 주기: 토양 검사를 하지 않을 경우, 모종을 심으면서 복합비료 (all-purpose fertilizer, 8-8-8 또는 10-10-10 혼합비율)를 제품 표기량에 맞게 뿌려줍니다. 8~10인치 높이로 컹을 때쯤, 반경 4~6 인치 떨어진 지점에 복합비료를 다시 뿌려줍니다.

병충해 및 잡초 관리: 병충해 관리를 자주 해 줘야 생리장해를 막을 수 있습니다. 살충 비누 (insecticidal soap (연조직 곤충용)) 또는 분말 또는 스프레이 형태의 BT제 (애벌레 등 해충 방지에 효과적인 농약)를 사용하고, 주요 병해 방제를 위해 살진균제를 뿌려주세요. 제품 설명문을 항상 준수해야 합니다. 멀칭을 하면 잡초와 병충해를 방지할 수 있습니다.

수확: 아주심기 후 35~40일 사이에 수확이 가능하며, 품종에 따라 수확 시기가 다릅니다.

그 외 정보: 여름호박은 크기가 큰 작물로, 주로 계단식 언덕에 심습니다. 원활한 배수를 위해 15~36인치 간격으로 심습니다 (여유공간이 있는 경우, 36~48인치 간격이 최적임). 더 자세한 정보는 www.aces.edu/go/growmore 에서 확인하세요.

그로우
모어
기브모어

앨라배마 A&M 대학교와 오번 대학교의 앨라배마 코퍼러티브 익스텐션 시스템 (Alabama Cooperative Extension System) 은 동등한 기회를 실현하는 교육기관이자 고용기관입니다. 모든 이용자를 환영합니다. 웹 접근성 관련 필요한 사항이 있다면 문의해 주시기 바랍니다.

© 2022 년 앨라배마 코퍼러티브 익스텐션 시스템. 관련 소유. www.aces.edu ANR-2876-C

www.aces.edu/go/growmore

extension
ALABAMA A&M & AUBURN UNIVERSITIES

이곳에 스캔하세요

