

南瓜 (夏季)



阳光: 种在阳光充足的地方 (每天日照有 6 到 8 小时)。植苗要在每行内要间隔 15 至 24 英寸, 或在一个 5 至 7 加仑大小的盆中种植 1 棵苗。从四月到七月在所有霜害过去后种植。

土壤: 用有机物改良土壤, 打造出排水性良好的土壤。避免在未改良的沙土或重粘土土壤中种植。如果土壤测试结果显示 pH 低于 6.2, 在早春按建议的方式加石灰。如果土壤测试结果显示 pH 高于 6.2, 加一种 pH 中性的填充物, 例如石膏。每株植物添加 ¼ 杯石膏以防止开花尾。

如果是在盆栽菜园中种植植物, 每个花盆加 ¼ 杯石膏。如要确保排水情况良好, 使用花盆用土并确保每个花盆都有排水孔。您也可以使用自吸水盆。

水: 土壤一直保持湿润但不要太潮湿。每周给 1 到 2 英寸的水, 在炎热的夏季可以多给一些。叶子保持干燥, 以便防止真菌病。覆盖物有助于保持水分。

种植: 直接把种子播种在 1 英寸深且相距 24 英寸。当苗到 4 到 5 英寸时行苗, 使之相距 12 英寸。如果植物长得太密, 它会不好或无法出瓜来。不建议移栽。

施肥: 如果您没有做土壤测试, 请在种植前并根据测试上的说明施用通用肥料 (8-8-8 或 10-10-10)。当植物长到 8-10 英寸高再洒在离茎 4-6 英寸处 (施肥料)。

昆虫/疾病/杂草: 经常检查植物有无受到虫害或疾病的影响。用杀虫皂 (杀死昆虫) 或 Bt 粉或伊维菌素 (杀死毛毛虫, 也称“蠕虫”)。经常喷洒菌剂, 以便控制常见的真菌病。每次都遵照测试上的说明。土壤覆盖物能抑制杂草及疾病。

收割: 第 35-40 天可进行采摘。采摘的时机因瓜的种类不同而异。

其他: 夏南瓜是大棵的植物, 通常种在壅土的畦中, 间隔 15-36 英寸 (如果空间允许的, 最好间隔 36-48 英寸), 以确保排水情况良好。访问 www.aces.edu/go/growmore 来了解更多信息。

种植
越多
给予越多

阿拉巴马州合作推广系 (阿拉巴马州工大学和奥本大学) 是机会均等的教育机构和雇主。欢迎每一个人! 如果您有无障碍通行需求, 请告知我们。
© 2022 年阿拉巴马州合作推广系版权所有。保留所有权利。www.aces.edu ANR-2876-C

www.aces.edu/go/growmore

extension
ALABAMA A&M & AUBURN UNIVERSITIES

在框里扫描

