

# Pepino



**Sol:** Siembre donde las semillas tengan luz directa del sol (de 6 a 8 horas). Separe las semillas de 12 a 24 pulgadas a lo largo de hiladas o coloque una planta en cada contenedor de 3 a 5 galones. Siembre de abril a julio, después de que haya pasado cualquier peligro de helada.

**Suelo:** Acondicione con materia orgánica para crear un suelo bien drenado. Evite sembrar en suelo arenoso o muy arcilloso sin haberlo acondicionado. Si el análisis del suelo muestra que el pH es inferior a 6,2, aplique cal al comienzo de la primavera y según las recomendaciones. Si el nivel del pH es superior a 6,2, aplique un suplemento de calcio a pH neutro, como el yeso. Añada ¼ de taza de yeso por planta para evitar la podredumbre apical.

Si cultiva en contenedores, acondicione la tierra con ¼ de taza de yeso. Para lograr un drenaje adecuado, utilice una mezcla para macetas y asegúrese de que los recipientes tengan agujeros de drenaje. También puede utilizar contenedores con autorriego.

**Agua:** Mantenga la tierra constantemente húmeda pero no saturada. Aplique entre 1 y 2 pulgadas de agua por semana y un poco más durante los días calurosos de verano. Mantenga las hojas secas para evitar enfermedades fúngicas. El mantillo ayuda a retener la humedad.

**CULTIVE  
MÁS  
DONE MÁS**

**Cultivo:** Siembre las semillas a 1 pulgada de profundidad. Cuando los brotes tengan entre 4 y 5 pulgadas de altura, entresaque plantas para lograr una separación de 12 pulgadas entre ellas. Las plantas no crecerán bien ni darán frutos si se encuentran encimadas. No se recomienda trasplantar.

**Fertilizante:** Si no cuenta con un análisis del suelo, aplique un fertilizante multiuso (8-8-8 o 10-10-10) al momento de la siembra y según las indicaciones de la etiqueta. Vuelva a aplicarlo a un costado de la planta, a una distancia de entre 4 y 6 pulgadas del tallo (chorreado), cuando la enredadera comience a crecer.

**Insectos/Enfermedades/Maleza:** Explore las plantas con frecuencia en busca de daños causados por insectos y enfermedades. Utilice jabón insecticida para los insectos de cuerpo blando o polvo o espray Bt para las orugas, también conocidas como "gusanos". Rocíe fungicida con frecuencia para eliminar las enfermedades fúngicas más comunes. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta. El mantillo inhibe las malas hierbas y las enfermedades.

**Cosecha:** Coseche entre los 40 y los 50 días. El tiempo de cosecha dependerá de la variedad.

**Otros:** El cultivo de las plantas de pepino en enrejado ocupa menos espacio en el jardín, mantiene la fruta limpia, reduce las enfermedades y facilita la cosecha.

Visite [www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore) para saber más.

ESCANEAR AQUÍ



**CULTIVE  
MÁS  
DONE MÁS**

El Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama (Universidad A&M de Alabama y Universidad de Auburn) es educador y empleador que promueve la igualdad de oportunidades. ¡Son todos bienvenidos! Por favor, informenos si tiene requerimientos de accesibilidad.

© 2022 por el Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama. Todos los derechos reservados. [www.aces.edu](http://www.aces.edu) ANR-2876-D

[www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore)

**extension**  
ALABAMA A&M & AUBURN UNIVERSITIES