

방울양배추(Brussels Sprouts)



햇빛 세기: 일조량이 풍부한 맑은 날에 심습니다(6~8시간 직사광선을 받는 곳이어야 함). 18인치 간격으로 나란히 심어야 하며, 버킷에 심는다면 5~7 gal. 부피 버킷당 1그루가 적합합니다. 8월에 심으세요.

토양 상태: 유기물을 섞어 물 빠짐을 좋게 합니다. 개량되지 않은 모래나 중점토에 심지 않도록 합니다. 토양 검사를 실시했고 산도(pH)가 6.2 미만으로 나왔다면, 5월 또는 6월에 석회질 비료를 권장량만큼 뿌려줍니다.

버킷 텃밭의 물 빠짐을 좋게 하려면 분갈이 배합토를 사용하고 버킷에 배수 구멍이 뚫려 있어야 합니다. 자체적인 물주기 기능이 있는 화분도 좋습니다.

물 주기: 토양의 수분을 일정하게 유지하되, 수분이 너무 많아서도 안 됩니다. 매주 1~2인치 깊이 정도로 물을 주고, 잎이 건조해야 곰팡이병을 예방할 수 있습니다. 멀칭을 하면 수분 유지에 도움이 됩니다.

심기: 8월이 되면 ¼인치 깊이 구덩이를 파서 씨를 심습니다. 싹을 틔워 4주간 키운 다음 심어도 됩니다. 1주간 실외에 내놓아 외부 환경에 서서히 적응시킨 후 텃밭에 옮겨 심습니다. 모종을 구매해서 심는 경우, 색깔이 선명하고 튼튼하게 보이는 것으로 고릅니다. 분형근(root ball)이 완전히 덮일 정도의 깊이 구덩이를 팝니다. 흙을 두드려서 모종을 단단히 고정시키고 물을 흠뻑 줍니다.

**그로우
모어
기브 모어**

www.aces.edu/go/growmore

비료 주기: 토양 검사를 하지 않을 경우, 모종을 심으면서 복합비료(all-purpose fertilizer, 8-8-8 또는 10-10-10 혼합비율)를 제품 표기량에 맞게 뿌려줍니다. 옮겨심기하고 3주 후, 줄기에서 4-6인치(가까이) 둘레로 복합비료를 다시 뿌려줍니다.

병충해 및 잡초 관리: 병충해 관리를 자주 해 줘야 생리장해를 막을 수 있습니다. 살충 비누(insecticidal soap(연조직 곤충용)) 또는 분말이나 스프레이 형태의 BT제(애벌레 등 해충 방지에 효과적인 농약)를 사용하고, 주요 병해 방제를 위해 살진균제를 정기적으로 뿌려주세요. 제품 설명문을 항상 준수해야 합니다. 멀칭을 하면 잡초와 병충해를 방지할 수 있습니다.

수확: 양배추가 단단해지는 시기인 90~120일 사이에 수확합니다. 품종에 따라 수확 시기가 다릅니다.

그 외 정보: 방울양배추는 씨앗을 심고 충분히 자라기까지 3개월 이상 걸립니다. 봄 텃밭으로 기른다면 옮겨심기가 최적입니다. 양배추가 성장함에 따라 단단해지면 줄기 아래쪽에 달린 양배추부터 따기 시작해서 줄기 위쪽으로 점차 수확 범위를 넓혀 나갑니다. 줄기 가장 아랫부분에 자란 큰 잎은 작물 생장에 필수적이므로 따지 않고 그대로 둡니다.

더 자세한 정보는 www.aces.edu/go/growmore 에서 확인하세요.

그로우
모어
기브 모어

앨라배마 A&M 대학교와 오번 대학교의 앨라배마 코퍼러티브 익스텐션 시스템 (Alabama Cooperative Extension System) 은 동등한 기회를 실현하는 교육기관이자 고용기관입니다. 모든 이용자를 환영합니다. 웹 접근성 관련 필요한 사항이 있다면 문의해 주시기 바랍니다.

© 2022 년 앨라배마 코퍼러티브 익스텐션 시스템. 만권 소유 www.aces.edu ANR-2876-G

www.aces.edu/go/growmore

extension
ALABAMA A&M & AUBURN UNIVERSITIES

이곳에 스캔하세요

