

Col



Sol: Siembre donde las semillas tengan luz directa del sol (de 6 a 8 horas). Separe las semillas unas 12 pulgadas a lo largo de hileras o coloque una planta en cada contenedor de 5 a 7 galones. Siembre desde enero hasta mediados de febrero y desde mediados de julio hasta mediados de agosto.

Suelo: Acondicione con materia orgánica para crear un suelo bien drenado. Evite sembrar en suelo arenoso o muy arcilloso sin haberlo acondicionado. Si el análisis del suelo muestra que el pH es inferior a 6,2, aplique cal en octubre o en noviembre y según las recomendaciones.

Para lograr un drenaje adecuado, si cultiva en contenedores, utilice una mezcla para macetas y asegúrese de que los recipientes tengan agujeros de drenaje. También puede utilizar contenedores con autorriego.

Agua: Mantenga la tierra constantemente húmeda pero no saturada. Aplique entre 1 y 2 pulgadas de agua por semana. Mantenga las hojas secas para evitar enfermedades fúngicas. El mantillo ayuda a retener la humedad.

Cultivo: Cultive las semillas mediante siembra directa a $\frac{1}{2}$ pulgada de profundidad. Comience a armar los plántones de interior de 3 a 4 semanas antes de la siembra y, una semana antes, prepárelos lentamente para trasplantarlos en el jardín. Trasplántelos cuando aparezcan entre 3 y 4 hojas. Si compra trasplantes, elija los que tengan un color saludable y un aspecto fornido. Evite aquellos que tengan flores. El hoyo para plantarlos debe ser tan profundo como el cepellón. Aplane la tierra con firmeza y riegue mucho.

Fertilizante: Si no cuenta con un análisis del suelo, aplique un fertilizante multiuso (8-8-8 o 10-10-10) al momento de la siembra y según las indicaciones de la etiqueta. Vuelva a aplicarlo a un costado de la planta, a una distancia de entre 4 y 6 pulgadas del tallo (chorreado), 3 o 4 semanas luego de la siembra.

Insectos/Enfermedades/Maleza: Explore las plantas con frecuencia en busca de daños causados por insectos y enfermedades. Utilice jabón insecticida para los insectos de cuerpo blando o polvo o espray Bt para las orugas, también conocidas como "gusanos". Rocíe fungicida con frecuencia para eliminar las enfermedades fúngicas más comunes. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta. El mantillo inhibe las malas hierbas y las enfermedades.

Cosecha: Coseche entre los 60 y los 85 días, cuando la cabeza de la col se vuelva firme. El tiempo de cosecha dependerá de la variedad.

Otros: El espacio que deje entre las plantas afectará su tamaño. Se recomienda dejar una separación mínima de entre 12 y 15 pulgadas. Una vez cosechada, la col puede conservarse en el refrigerador hasta por 2 meses.

Visite www.aces.edu/go/growmore para saber más.

**CULTIVE
MÁS
DONE MÁS**

El Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama (Universidad A&M de Alabama y Universidad de Auburn) es educador y empleador que promueve la igualdad de oportunidades. ¡Son todos bienvenidos! Por favor, informenos si tiene requerimientos de accesibilidad © 2022 por el Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama. Todos los derechos reservados. www.aces.edu ANR-2876-1

www.aces.edu/go/growmore

extension
ALABAMA A&M & AUBURN UNIVERSITIES

ESCANEAR AQUÍ

