

卷心菜 (包菜)



阳光:种在阳光充足的地方(每天日照有 6 到 8 小时)。植苗时在每行内要间隔 12 英寸,或在每个 5-7 加仑大小的盆中种植 1 棵苗。在一月到二月中以及七月中到八月中旬间种植。

土壤:用有机物改良土壤,打造出排水性良好的土壤。避免在未经改良的沙质土壤或重粘土土壤中种植。如果土壤测试结果显示 pH 值低于 6.2, 请在十月或十一月按建议的方式加石灰。

在盆栽菜园中,请使用花盆专用土并确保每个花盆都有排水孔,以便保持良好的排水情况。或者,您也可以考虑用自动吸水盆。

水:请让土壤一直保持湿润但不要太潮湿。每周浇约 1-2 英寸水。避免把叶子打湿,以便防止真菌病。覆盖物有助于保持水分。

种植:直接把种子播在 $\frac{1}{2}$ 英寸深处。请在种植前 3-4 周育苗,并且在种到园中去前一周让苗渐渐适应室外环境。在长出 3-4 片叶子时进行移栽。如果您买用于移栽的苗,请选择看上去颜色健康并且植株茁壮的苗。请不要挑有花的苗。挖一个和根团一样深的洞来种苗。把土拍结实,并且把水浇透。

施肥:如果您没有做过土壤测试,请在种植时根据标签上的说明施用通用肥料(8-8-8 或 10-10-10)。植苗后 3-4 周在距离茎秆 4-6 英寸处在植株旁(侧施肥料)进行追肥。

昆虫/疾病/杂草:经常检查植物有无受到虫害或疾病的影响。用杀虫皂(针对软体昆虫)或 Bt 粉或喷雾剂(针对毛毛虫,也称为“蠕虫”)。经常喷洒杀菌剂,以便控制常见的真菌病。每次都请遵照标签上的说明。土壤覆盖物能抑制杂草及疾病。

采摘:在 60-85 天期间叶球变坚实时采摘。采摘的时机因种类不同而异。

其他:植株的间距会影响植株的大小。我们建议两颗菜之间至少间隔 12-15 英寸。采下的卷心菜放在冰箱中可以保存长达 2 个月。

请访问 www.aces.edu/go/growmore 来了解更多信息。

种植
越多
给予越多

阿拉巴马州合作推广系统(阿拉巴马州农工大学和奥本大学)是机会均等的教育机构和雇主。欢迎每一个人!如果您有无障碍通行需求,请告诉我们。

© 2022 年阿拉巴马州合作推广系统版权所有,保留所有权利。www.aces.edu ANR-2876-I

www.aces.edu/go/growmore



在这里扫描

