

양배추



햇빛 세기: 일조량이 풍부한 맑은 날에 심습니다(6~8시간 직사광선을 받는 곳이어야 함). 12인치 간격으로 나란히 심어야 하며, 버킷에 심는다면 5~7 gal. 부피 버킷당 1그루가 적합합니다. 1월~2월 중순, 7월 중순~8월 중순에 심습니다.

토양 상태: 유기물을 섞어 물 빠짐을 좋게 합니다. 개량되지 않은 모래나 중점토에 심지 않도록 합니다. 토양 검사를 실시했고 산도(pH)가 6.2 미만으로 나왔다면, 10월 또는 11월에 석회질 비료를 권장량만큼 뿌려줍니다.

버킷 텃밭의 물 빠짐을 좋게 하려면 분갈이 배합토를 사용하고 버킷에 배수 구멍이 뚫려 있어야 합니다. 자체적인 물주기 기능이 있는 화분도 좋습니다.

물 주기: 토양의 수분을 일정하게 유지하되, 수분이 너무 많아서도 안 됩니다. 매주 1~2인치 깊이 정도로 물을 주고, 잎이 건조해야 곰팡이병을 예방할 수 있습니다. 멀칭을 하면 수분 유지에 도움이 됩니다.

심기: ½인치 깊이로 구덩이를 파서 씨를 심습니다. 싹을 틔워 3~4주간 키운 다음, 1주간 실외에 내놓아 외부 환경에 서서히 적응시킨 후 텃밭에 옮겨 심습니다. 잎이 3~4개 나면 옮겨심기 합니다. 모종을 구매해서 심는 경우, 색깔이 선명하고 튼튼하게 보이는 것으로 고릅니다. 꽃이 핀 모종은 피하도록 합니다. 분형근(root ball)이 완전히 덮일 정도의 깊이 구덩이를 팝니다. 흙을 두드려서 모종을 단단히 고정시키고 물을 흠뻑 줍니다.

그로우
모어
기브 모어

www.aces.edu/go/growmore

비료 주기: 토양 검사를 하지 않을 경우, 모종을 심으면서 복합비료(all-purpose fertilizer, 8-8-8 또는 10-10-10 혼합비율)를 제품 표기량에 맞게 뿌려줍니다. 심고 나서 3~4주쯤, 줄기에서 4-6 인치(가까이) 둘레로 복합비료를 다시 뿌려줍니다.

병충해 및 잡초 관리: 병충해 관리를 자주 해 줘야 생리장애를 막을 수 있습니다. 살충 비누(insecticidal soap(연조식 곤충용)) 또는 분말이나 스프레이 형태의 BT제(애벌레 등 해충 방지에 효과적인 농약)를 사용하고, 주요 병해 방제를 위해 살진균제를 정기적으로 뿌려주세요. 제품 설명문을 항상 준수해야 합니다. 멀칭을 하면 잡초와 병충해를 방지할 수 있습니다.

수확: 양배추 위가 단단하게 결구되는 시기인 60~85일 사이에 수확합니다. 품종에 따라 수확 시기가 다릅니다.

그 외 정보: 심는 간격이 작물 크기에 영향을 줄 수 있으므로, 최소 12~15인치 간격을 두고 심는 것을 권장합니다. 수확한 양배추는 최대 2개월까지 냉장 보관 가능합니다.

더 자세한 정보는 www.aces.edu/go/growmore 에서 확인하세요.

**그로우
모어
기브 모어**

앨라배마 A&M 대학교와 오번 대학교의 앨라배마 코퍼러티브 익스텐션 시스템 (Alabama Cooperative Extension System) 은 동등한 기회를 실현하는 교육기관이자 고용기관입니다. 모든 이용자를 환영합니다. 웹 접근성 관련 필요한 사항이 있다면 문의해 주시기 바랍니다.

© 2022 년 앨라배마 코퍼러티브 익스텐션 시스템. 관련 소유 www.aces.edu ANR-2876-1

www.aces.edu/go/growmore

extension
ALABAMA A&M & AUBURN UNIVERSITIES

이곳에 스캔하세요

