

Zanahorias



Sol: Siembre donde las semillas tengan luz directa del sol (de 6 a 8 horas). Separe las semillas de 1 a 2 pulgadas a lo largo de hileras o coloque de 5 a 6 plantas en cada contenedor de 2 a 3 galones. Siembre en marzo para cosechar en primavera (entre 4 y 6 semanas antes de la última helada primaveral prevista) y entre julio y septiembre para cosechar en otoño.

Suelo: Acondicione con materia orgánica para crear un suelo bien drenado. Evite sembrar en suelo arenoso o muy arcilloso sin haberlo acondicionado. Si el análisis del suelo muestra que el pH es inferior a 6,2, aplique cal en enero y según las recomendaciones.

Para lograr un drenaje adecuado, si cultiva en contenedores, utilice una mezcla para macetas y asegúrese de que los recipientes tengan agujeros de drenaje. También puede utilizar contenedores con autorriego.

Agua: Mantenga la tierra constantemente húmeda pero no saturada. Aplique entre 1 y 2 pulgadas de agua por semana. Mantenga las hojas secas para evitar enfermedades fúngicas. El mantillo ayuda a retener la humedad.

Cultivo: Esparza una abundante cantidad de semillas mediante siembra directa, a no más de $\frac{1}{4}$ de pulgada de profundidad. Cuando los brotes tengan 1 pulgada de altura, entresaque plantas para lograr una separación de 2 pulgadas entre ellas.

Fertilizante: Si no cuenta con un análisis del suelo, aplique un fertilizante multiuso (8-8-8 o 10-10-10) al momento de la siembra y según las indicaciones de la etiqueta. Vuelva a aplicarlo a un costado de la planta, a una distancia de entre 4 y 6 pulgadas del tallo (chorreado), entre 4 y 6 semanas luego de la siembra.

Insectos/Enfermedades/Maleza: Explore las plantas con frecuencia en busca de daños causados por insectos y enfermedades. Utilice jabón insecticida para los insectos de cuerpo blando o polvo o espray Bt para las orugas, también conocidas como "gusanos". Rocíe fungicida con frecuencia para eliminar las enfermedades fúngicas más comunes. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta. El mantillo inhibe las malas hierbas y las enfermedades.

Cosecha: Coseche entre los 60 y los 80 días, cuando la corona de la raíz tenga un diámetro de entre $\frac{3}{4}$ de pulgada y 1 pulgada. El tiempo de cosecha dependerá de la variedad.

Otros: Las semillas de zanahoria brotan lentamente. Mantenga la tierra húmeda hasta que aparezcan los brotes. Las fluctuaciones en el riego generan zanahorias con grietas, de mala calidad y que hasta suelen pudrirse.

Visite www.aces.edu/go/growmore para saber más.

**CULTIVE
MÁS
DONE MÁS**

El Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama (Universidad A&M de Alabama y Universidad de Auburn) es educador y empleador que promueve la igualdad de oportunidades. ¡Son todos bienvenidos! Por favor, infórmenos si tiene requerimientos de accesibilidad © 2022 por el Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama. Todos los derechos reservados. www.aces.edu ANR-2876-J

www.aces.edu/go/growmore

extension
ALABAMA A&M & AUBURN UNIVERSITIES

ESCANEAR AQUÍ

