

# 당근



**햇빛 세기:** 일조량이 풍부한 맑은 날에 심습니다(6~8시간 직사광선을 받는 곳이어야 함). 1~2인치 간격으로 나란히 심어야 하며, 버킷에 심는다면 2~3 gal. 부피 버킷당 5~6그루가 적당합니다. 봄 수확은 3월에 심고(마지막 꽃샘추위가 예상되기 4~6주 전), 가을 수확은 7월~9월에 심습니다.

**토양 상태:** 유기물을 섞어 물 빠짐을 좋게 합니다. 개량되지 않은 모래나 중점토에 심지 않도록 합니다. 토양 검사를 실시했고 산도(pH)가 6.2 미만으로 나왔다면, 1월에 석회질 비료를 권장량만큼 뿌려줍니다.

버킷 텃밭의 물 빠짐을 좋게 하려면 분갈이 배합토를 사용하고 버킷에 배수 구멍이 뚫려 있어야 합니다. 자체적인 물주기 기능이 있는 화분도 좋습니다.

**물 주기:** 토양의 수분을 일정하게 유지하되, 수분이 너무 많아서도 안 됩니다. 매주 1~2인치 깊이 정도로 물을 주고, 잎이 건조해야 곰팡이병을 예방할 수 있습니다. 멀칭을 하면 수분 유지에 도움이 됩니다.

**심기:** ¼인치 깊이가 넘지 않게 얇은 구덩이를 씨를 두껍게 뿌려심습니다. 싹이 1인치 높이로 자라면, 2인치 간격으로 솎아냅니다.

**비료 주기:** 토양 검사를 하지 않을 경우, 모종을 심으면서 복합비료(all-purpose fertilizer, 8-8-8 또는 10-10-10 혼합비율)를 제품 표기량에 맞게 뿌려줍니다. 심고 나서 4~6주쯤, 줄기에서 인치(가까이) 둘레로 복합비료를 다시 뿌려줍니다.

**병충해 및 잡초 관리:** 병충해 관리를 자주 해 줘야 생리장해를 막을 수 있습니다. 살충 비누(insecticidal soap(연조식 곤충용)) 또는 분말이나 스프레이 형태의 BT제(애벌레 등 해충 방지에 효과적인 농약)를 사용하고, 주요 병해 방제를 위해 살진균제를 뿌려주세요. 제품 설명문을 항상 준수해야 합니다. 멀칭을 하면 잡초와 병충해를 방지할 수 있습니다.

**수확:** 당근의 주두부(root crown) 지름이 약 ¾~1인치가 되는 60~80일 사이에 수확합니다. 품종에 따라 수확 시기가 다릅니다.

**그 외 정보:** 당근은 씨앗을 뿌린 뒤 서서히 발아하므로, 싹이 틀 때까지 토양이 마르지 않게 수분을 유지해 줍니다. 물을 주는 양이 일정치 않으면 당근이 갈라지고, 품질 저하는 물론 간혹 썩을 수도 있으니 주의하세요.

더 자세한 정보는 [www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore) 에서 확인하세요.

**그로우  
모어  
기브 모어**

앨라배마 A&M 대학교와 오번 대학교의 앨라배마 코퍼러티브 익스텐션 시스템 (Alabama Cooperative Extension System) 은 동등한 기회를 실현하는 교육기관이자 고용기관입니다. 모든 이용자를 환영합니다. 웹 접근성 관련 필요한 사항이 있다면 문의해 주시기 바랍니다.  
© 2022 년 앨라배마 코퍼러티브 익스텐션 시스템. 관련 소유 [www.aces.edu](http://www.aces.edu) ANR-2876-J

[www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore)

**extension**  
ALABAMA A&M & AUBURN UNIVERSITIES

이곳에 스캔하세요

