

Pimientos (dulces y picantes)



Sol: Siembre donde las semillas tengan luz directa del sol (de 6 a 8 horas). Separe las semillas unas 24 pulgadas a lo largo de hileras o coloque una planta en cada contenedor de 5 a 7 galones. Siembre de abril a mayo, después de que haya pasado cualquier peligro de helada.

Suelo: Acondicione con materia orgánica para crear un suelo bien drenado. Evite sembrar en suelo arenoso o muy arcilloso sin haberlo acondicionado. Si el análisis del suelo muestra que el pH es inferior a 6,2, aplique cal en enero o en febrero y según las recomendaciones. Si el nivel de pH es superior a 6,2, aplique un suplemento de calcio a pH neutro, como el yeso. Añada ¼ de taza de yeso por planta para evitar la podredumbre apical.

Si cultiva en contenedores, acondicione la tierra con ¼ de taza de yeso. Para lograr un drenaje adecuado, utilice una mezcla para macetas y asegúrese de que los recipientes tengan agujeros de drenaje. También puede utilizar contenedores con autorriego.

Agua: Mantenga la tierra constantemente húmeda pero no saturada. Aplique entre 1 y 2 pulgadas de agua por semana y un poco más durante los días calurosos de verano. Mantenga las hojas secas para evitar enfermedades fúngicas. El mantillo ayuda a retener la humedad.

Cultivo: Comience a armar los plantones de interior de 6 a 8 semanas antes de la época de la siembra y, una semana antes, prepárelos lentamente para trasplantarlos en la huerta. Si compra trasplantes, elija los que tengan un color saludable y un aspecto fornido. Evite aquellos que tengan flores o frutas. El hoyo para plantarlos debe ser tan profundo como el cepellón o aún más. Aplane la tierra con firmeza y riegue mucho.

Fertilizante: Si no cuenta con un análisis del suelo, aplique un fertilizante multiuso (8-8-8 o 10-10-10) al momento de la siembra y según las indicaciones de la etiqueta. Vuelva a aplicarlo a un costado de las plantas, a una distancia de entre 4 y 6 pulgadas del tallo (chorreado), cuando aparezca el primer fruto.

Insectos/Enfermedades/Maleza: Explore las plantas con frecuencia en busca de daños causados por insectos y enfermedades. Utilice jabón insecticida para los insectos de cuerpo blando o polvo o espray Bt para las orugas, también conocidas como “gusanos”. Rocíe fungicida con frecuencia para eliminar las enfermedades fúngicas más comunes. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta. El mantillo inhibe las malas hierbas y las enfermedades.

Cosecha: Coseche entre los 65 y los 85 días, cuando los frutos estén firmes y coloridos. El tiempo de cosecha dependerá de la variedad.

Otros: Siembre los pimientos en una jaula para que tengan mayor apoyo.

Visite www.aces.edu/go/growmore para saber más.

**CULTIVE
MÁS
DONE MÁS**

El Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama (Universidad A&M de Alabama y Universidad de Auburn) es educador y empleador que promueve la igualdad de oportunidades. ¡Son todos bienvenidos! Por favor, infórmenos si tiene requerimientos de accesibilidad.

© 2022 por el Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama. Todos los derechos reservados. www.aces.edu ANR-2878-P

www.aces.edu/go/growmore

extension
ALABAMA A&M & AUBURN UNIVERSITIES

ESCANEAR AQUÍ

