

Calabaza (de invierno)



Sol: Siembre donde las semillas tengan luz directa del sol (de 6 a 8 horas). Separe las semillas unas 36 pulgadas a lo largo de hileras o coloque una planta en cada contenedor de 5 a 7 galones. Siembre en abril, después de que haya pasado cualquier peligro de helada, y desde mediados de julio hasta principios de agosto.

Suelo: Acondicione con materia orgánica para crear un suelo bien drenado. Evite sembrar en suelo arenoso o muy arcilloso sin haberlo acondicionado. Si el análisis del suelo muestra que el pH es inferior a 6,2, aplique cal en enero o en febrero y según las recomendaciones. Si el nivel de pH es superior a 6,2, aplique un suplemento de calcio a pH neutro, como el yeso. Añada $\frac{1}{4}$ de taza de yeso por planta para evitar la podredumbre apical.

Si cultiva en contenedores, acondicione la tierra con $\frac{1}{4}$ de taza de yeso. Para lograr un drenaje adecuado, utilice una mezcla para macetas y asegúrese de que los recipientes tengan agujeros de drenaje. También puede utilizar contenedores con autorriego.

Agua: Mantenga la tierra constantemente húmeda pero no saturada. Aplique entre 1 y 2 pulgadas de agua por semana y un poco más durante los días calurosos de verano. Mantenga las hojas secas para evitar enfermedades fúngicas. El mantillo ayuda a retener la humedad.

Cultivo: Cultive las semillas mediante siembra directa a 1 pulgada de profundidad. Cuando los brotes tengan entre 4 y 5 pulgadas de altura, entresaque plantas para lograr una separación de 12 pulgadas entre ellas. Las plantas no crecerán bien ni producirán si se encuentran encimadas. No se recomienda trasplantar.

Fertilizante: Si no cuenta con un análisis del suelo, aplique un fertilizante multiuso (8-8-8 o 10-10-10) al momento de la siembra y según las indicaciones de la etiqueta. Vuelva a aplicarlo a un costado de la planta, a una distancia de entre 4 y 6 pulgadas del tallo (chorreado), cuando las vides comiencen a crecer.

Insectos/Enfermedades/Maleza: Explore las plantas con frecuencia en busca de daños causados por insectos y enfermedades. Utilice jabón insecticida para los insectos de cuerpo blando o polvo o espray Bt para las orugas, también conocidas como “gusanos”. Rocíe fungicida con frecuencia para eliminar las enfermedades fúngicas más comunes. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta. El mantillo inhibe las malas hierbas y las enfermedades.

Cosecha: Coseche entre los 85 y los 100 días, cuando los frutos estén completamente desarrollados, la corteza sea relativamente dura y brillante y la base del fruto sea de color entre crema y naranja. El tiempo de cosecha dependerá de la variedad.

Otros: Las plantas de calabaza de invierno son muy grandes y normalmente se cultivan en surcos con una separación de entre 15 y 36 pulgadas.

Visite www.aces.edu/go/growmore para saber más.

ESCANEAR AQUÍ



**CULTIVE
MÁS
DONE MÁS**

El Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama (Universidad A&M de Alabama y Universidad de Auburn) es educador y empleador que promueve la igualdad de oportunidades. ¡Son todos bienvenidos! Por favor, informenos si tiene requerimientos de accesibilidad.

© 2022 por el Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama. Todos los derechos reservados. www.aces.edu ANR-2876-R

www.aces.edu/go/growmore

extension
ALABAMA A&M & AUBURN UNIVERSITIES