


西瓜



阳光:种在阳光充足的地方(每天日照有 6 到 8 小时)。植苗时在壅土的垄中要间隔 5 英尺,或在每个 5-7 加仑大小的盆中种植 1 棵苗(请看下面“种植”这部分)。在四月所有霜冻危险过去后以及六月中时种植。

土壤:用有机物改良土壤,打造出排水性良好的土壤。避免在未经改良的沙质土壤或重粘土土壤中种植。如果土壤测试结果显示 pH 值低于 6.2,请在一月或二月按建议的方式加石灰。如果土壤测试结果显示 pH 值高于 6.2,请加一种 pH 值中性的钙补充剂,例如石膏。每株植物加 $\frac{1}{4}$ 杯石膏以防止花开烂尾。

如果是在盆栽菜园中种植植物,请给每个花盆加 $\frac{1}{4}$ 杯石膏来改良土壤。如要确保排水情况良好,请使用花盆专用土并确保每个花盆都有排水孔。或者,您也可以考虑用自动吸水盆。

水:请让土壤一直保持湿润但不要太潮湿。每周浇 1-2 英寸的水,并且在夏季天热时多浇一些。避免把叶子打湿,以便防止真菌病。覆盖物有助于保持水分。

种植
越多
给予越多

www.aces.edu/go/growmore

种植:直接把种子播在壅土的垄中或盆中 1 英寸深处, 以便保证排水情况良好。当苗长到 4-5 英寸高时进行间苗, 每个土丘或盆中只留下 1-2 棵苗。如果植物长得太挤, 它们会长不好或无法结出瓜来。不建议移栽。

施肥:如果您没有做过土壤测试, 请在种植时根据标签上的说明施用通用肥料 (8-8-8 或 10-10-10)。当藤蔓开始蔓生时, 在距离茎秆 4-6 英寸处植株旁 (侧施肥料) 进行追肥。

昆虫/疾病/杂草:经常检查植物有无受到虫害或疾病的影响。用杀虫皂 (针对软体昆虫) 或 Bt 粉或喷雾剂 (针对毛毛虫, 也称为“蠕虫”)。经常喷洒杀菌剂, 以便控制常见的真菌病。每次都请遵照标签上的说明。土壤覆盖物能抑制杂草及疾病。

采摘:在 80-90 天期间当瓜完全长大、瓜的颜色看上去暗淡、西瓜接触地面的部分呈黄色、并且在西瓜连在藤蔓处旁边有一根枯死的卷须或卷曲物时即可采摘。采摘的时机因种类不同而异。

其他:如果您用拍打的方式来看西瓜熟不熟, 您要的是听到沉闷而非清脆的声音。

请访问 www.aces.edu/go/growmore 来了解更多信息。

**种植
越多
给予越多**

阿拉巴马州合作推广系统 (阿拉巴马州农工大学和奥本大学) 是机会均等的教育机构和雇主。欢迎每一个人! 如果您有无障碍通行需求, 请告诉我们。
© 2022 年阿拉巴马州合作推广系统版权所有。保留所有权利。www.aces.edu ANR-2876-T

www.aces.edu/go/growmore

extension
ALABAMA A&M & AUBURN UNIVERSITIES

在这里扫描

