

Acelga



Sol: Siembre donde las semillas tengan luz directa del sol (de 6 a 8 horas). Separe las semillas de 4 a 6 pulgadas a lo largo de hileras o coloque de 4 a 6 plantas en cada contenedor de 5 galones. Siembre entre mediados de febrero y mediados de marzo para cosechar en primavera, y en septiembre para cosechar en otoño.

Suelo: Acondicione con materia orgánica para crear un suelo bien drenado. Evite sembrar en suelo arenoso o muy arcilloso sin haberlo acondicionado. Si el análisis del suelo muestra que el pH es inferior a 6.2, aplique cal al principio de la temporada de cultivo o según las recomendaciones.

Para lograr un drenaje adecuado, si cultiva en contenedores, utilice una mezcla para macetas y asegúrese de que los recipientes tengan agujeros de drenaje. También puede utilizar contenedores con autorriego.

Agua: Mantenga la tierra constantemente húmeda pero no saturada. Aplique entre 1 y 2 pulgadas de agua por semana. Mantenga las hojas secas para evitar enfermedades fúngicas. El mantillo ayuda a retener la humedad.

Cultivo: Cultive las semillas mediante siembra directa a $\frac{1}{2}$ pulgada de profundidad. Cuando aparezcan los brotes, entesaque plantas para lograr una separación de 4 a 6 pulgadas entre ellas. Comience a armar los plántones de interior de 3 a 4 semanas antes de la siembra y, una semana antes, prepárelos lentamente para trasplantarlos en el jardín. Si compra trasplantes, elija los que tengan un color saludable y un aspecto fornido. El hoyo para plantarlos debe ser tan profundo como el cepellón. Aplane la tierra con firmeza y riegue mucho.

www.aces.edu/go/growmore

**CULTIVE
MÁS
DONE MÁS**

Fertilizante: Si no cuenta con un análisis del suelo, aplique un fertilizante multiuso (8-8-8 o 10-10-10) al momento de la siembra y según las indicaciones de la etiqueta. Vuelva a aplicarlo a un costado de la planta, a una distancia de entre 4 y 6 pulgadas del tallo (chorreado), 2 semanas después del trasplante o 4 semanas después de la siembra directa.

Insectos/Enfermedades/Maleza: Explore las plantas con frecuencia en busca de daños causados por insectos y enfermedades. Utilice jabón insecticida para los insectos de cuerpo blando o polvo o spray Bt para las orugas, o gusanos. Rocíe fungicidas con frecuencia para eliminar las enfermedades fúngicas más comunes. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta. El mantillo inhibe las malas hierbas y las enfermedades.

Cosecha: Coseche entre los 50 y los 75 días, cuando las hojas alcancen una longitud de unas 8 pulgadas. El tiempo de cosecha dependerá de la variedad.

Otros: La acelga es pariente cercana de la remolacha de jardín que no desarrolla una raíz comestible. La parte verde de las hojas es comestible, y el ancho nervio central puede cocerse al vapor y comerse como los espárragos. Por su crecimiento erguido y sus hojas grandes y atractivas, la acelga puede utilizarse como ornamental en bordes de canteros y parterres.

Visite www.aces.edu/go/growmore para saber más.

**CULTIVE
MÁS
DONE MÁS**

El Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama (Universidad A&M de Alabama y Universidad de Auburn) es un educador, empleador y prestador de servicios que promueve la igualdad de oportunidades. © 2025 por el Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama. Todos los derechos reservados. www.aces.edu ANR-2876-V

www.aces.edu/go/growmore



ESCANEAR AQUÍ

