

아스파라거스



햇빛 세기: 일조량이 풍부한 맑은 날에 심습니다(6~8시간 직사광선을 받는 곳이어야 함). 1년된 크라운(줄기가 뻗어 나오는 중앙부)을 심는 것을 권장합니다. 12인치 간격으로 나란히 심습니다. 초봄에 심습니다.

토양 상태: 유기물을 섞어 물 빠짐을 좋게 합니다. 개량되지 않은 모래나 중점토(heavy clay soil)에 심지 않도록 합니다. 토양 검사 결과 산도(pH)가 6.2 미만으로 나왔다면, 석회질 비료를 권장량만큼 뿌려줍니다.

물 주기: 토양의 수분을 일정하게 유지하되, 수분이 너무 많아서도 안 됩니다. 매주 1~2인치 깊이 정도로 물을 주고, 무더운 여름날에는 물을 더 줍니다. 잎이 건조해야 곰팡이병을 예방할 수 있습니다. 멀칭을 하면 수분 유지에 도움이 됩니다.

심기: 크라운을 심으려면, 폭과 깊이가 각각 12인치인 고랑을 팍니다. 크라운을 고랑 속에 12~15인치 간격으로 배치합니다. 뿌리를 고르게 펼치고 그 위에 흙을 3인치 높이로 덮습니다. 싹이 트기 시작하면, 크라운 주변으로 흙을 돌우어서 고랑을 채웁니다.

비료 주기: 토양 검사를 하지 않을 경우, 모종을 심으면서 복합 비료(all-purpose fertilizer, 8-8-8 또는 10-10-10 혼합 비율)를 제품 표시량에 맞게 뿌려줍니다. 심고 나서 4~6주쯤, 줄기에서 반경 4~6인치 둘레로 다시 뿌려줍니다.

병충해 및 잡초 관리: 병충해 관리를 자주 해 줘야 생리장애를 막을 수 있습니다. 살충 비누 (insecticidal soap(연조직 곤충용)) 또는 분말이나 스프레이 형태의 BT제(애벌레 등 해충 방지에 효과적인 농약)를 사용하고, 주요 병해 방제를 위해 살진균제를 정기적으로 뿌려주세요. 제품 설명문을 항상 준수해야 합니다. 제품에 적힌 사용 지침을 항상 따르세요. 멀칭을 하면 잡초와 병충해를 방지할 수 있습니다.

수확: 두 번째 해에 수확합니다. 새순이 5~7인치 높이로 자라면, 약 2주간 매일 수확하고 즉시 냉장 보관합니다. 세 번째 해와 네 번째 해에는 수확기가 4주간 계속될 수도 있습니다. 네 번째 해 이후에는 새순이 가늘고 약해지기 전까지 6~8주간 수확합니다. 이러한 새순은 그대로 두어 아스파라거스 잎이 자라나도록 합니다. 이 잎은 첫 서리가 내린 후 자연히 시듭니다.

그 외 정보: 아스파라거스는 앨라배마주에서 잘 자라는 다년생 채소로 냉동 보관할 수 있습니다.

더 자세한 정보는 www.aces.edu/go/growmore에서 확인하세요.

QR 코드를 스캔하세요



**그로우
모어
기브 모어**

앨라배마 A&M 대학교와 오번 대학교의 앨라배마 코퍼레이트 익스텐션 시스템(Alabama Cooperative Extension System)은 균등한 기회를 실현하는 교육기관이자 고용기관 및 제공기관입니다. 2025년 8월 개정
© 2025년 앨라배마 코퍼레이트 익스텐션 시스템. 판권 소유. www.aces.edu ANR-2876-BB

www.aces.edu/go/growmore



extension
ALABAMA A&M AND AUBURN UNIVERSITIES