

# 爱尔兰土豆



**阳光:**种在阳光充足的地方(每天日照有 6 到 8 小时)。在每行内要间隔 10-12 英寸,或在每个 5 加仑大小的盆中种植 2 棵苗。在二月种植。

**土壤:**用有机物改良土壤,打造出排水性良好的土壤。避免在未经改良的沙质土壤或重粘土土壤中种植。

在盆栽菜园中,请使用花盆专用土并确保每个花盆都有排水孔,以便保持良好的排水情况。或者,您也可以考虑用自动吸水盆。

**水:**请让土壤一直保持湿润,但不要太潮湿。每周浇约 1-2 英寸水,并且在夏季天热时多浇一些。避免把叶子打湿,以便防止真菌病。覆盖物有助于保持水分。

**种植:**将种薯块按 10-12 英寸的间距种植,然后在犁沟中覆盖 2-3 英寸厚的土壤。行间距为 24 英寸。每块种薯块都应至少带有一个健康的芽眼。

**种植  
越多  
给予越多**

[www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore)

**施肥:**如果您没有做过土壤测试,请在种植时根据标签上的说明施用通用肥料(8-8-8 或 10-10-10)。植苗后 4-6 周时,在距离茎秆 4-6 英寸处(侧施肥料)进行追肥。

**昆虫/疾病/杂草:**经常检查植物有无受到虫害或疾病的影响。用杀虫皂(针对软体昆虫)或 Bt 粉或喷雾剂(针对毛毛虫或蠕虫)。经常喷洒杀菌剂,以便控制常见的真菌病。每次都请遵照标签上的说明。土壤覆盖物能抑制杂草及疾病。

**采摘:**当块茎完全长成且叶片开始枯萎时,即可采摘。细嫩的小土豆可在种植后 7-8 周采收。成熟的土豆可在种植后 3-4 个月采收。

**其他:**不要购买杂货店里的土豆来种植,应购买无病害的种薯。种薯块应在种植前 5-6 天切块,并晾干。

请访问 [www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore) 来了解更多信息。

**种植  
越多  
给予越多**

阿拉巴马州合作推广系统(阿拉巴马州农工大学和奥本大学)是机会均等的教育机构、雇主和提供者。2025 年 8 月修订 © 2025 年阿拉巴马州合作推广系统版权所有。保留所有权利。  
[www.aces.edu](http://www.aces.edu) ANR-2876-EE

[www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore)



在这里扫描

