

아이리시 감자



햇빛 세기: 일조량이 풍부한 맑은 날에 심습니다(6~8시간 직사광선을 받는 곳이어야 함). 10~12인치 간격으로 나란히 심어야 하며, 버킷에 심는다면 5갤런 버킷당 2그루가 적당합니다. 2월에 심습니다.

토양 상태: 유기물을 섞어 물 빠짐을 좋게 합니다. 개량되지 않은 모래나 중점토(heavy clay soil)에 심지 않도록 합니다.

버킷 텃밭의 물 빠짐을 좋게 하려면 분갈이 배합토를 사용하고 버킷에 배수 구멍이 뚫려 있어야 합니다. 자체 급수 기능이 있는 화분도 좋습니다.

물 주기: 토양의 수분을 일정하게 유지하되, 수분이 너무 많아서도 안 됩니다. 매주 1~2인치 깊이 정도로 물을 주고, 무더운 여름날에는 물을 더 줍니다. 잎이 건조해야 곰팡이병을 예방할 수 있습니다. 멀칭을 하면 수분 유지에 도움이 됩니다.

심기: 싹을 틔운 씨감자 조각을 10~12인치 간격으로 고랑에 심고 2~3인치 깊이로 흙을 덮습니다. 줄 간격을 24인치로 잡아 심습니다. 씨감자 조각마다 튼실한 씨눈이 적어도 하나는 있어야 합니다.

**그로우
모어
기브모어**

www.aces.edu/go/growmore

비료 주기: 토양 검사를 하지 않을 경우, 모종을 심으면서 복합 비료(all-purpose fertilizer, 8-8-8 또는 10-10-10 혼합 비율)를 제품 표시량에 맞게 뿌려줍니다. 심고 나서 4~6주쯤, 줄기에서 반경 4~6인치 둘레로 다시 뿌려줍니다.

병충해 및 잡초 관리: 병충해 관리를 자주 해 줘야 생리장해를 막을 수 있습니다. 살충 비누(insecticidal soap(연조직 곤충용)) 또는 분말이나 스프레이 형태의 BT제(애벌레 등 해충 방지에 효과적인 농약)를 사용하고, 주요 병해 방제를 위해 살진균제를 정기적으로 뿌려주세요. 제품 설명문을 항상 준수해야 합니다. 멀칭을 하면 잡초와 병충해를 방지할 수 있습니다.

수확: 덩이줄기가 완전히 자라고 잎이 시들기 시작할 때 수확합니다. 심은 지 7~8주가 지나면 작고 여린 감자부터 수확할 수 있습니다. 심고 나서 3~4개월쯤에는 완전히 자란 감자를 수확할 수 있습니다.

그 외 정보: 마트에서 판매하는 감자를 심을 목적으로 구매하지 마세요. 질병에 걸리지 않은 씨감자를 구매해야 합니다. 씨감자 조각은 심기 5~6일 전에 잘라서 건조시켜야 합니다.

더 자세한 정보는 www.aces.edu/go/growmore에서 확인하세요.

**그로우
모어
기브모어**

앨라배마 A&M 대학교와 오번 대학교의 앨라배마 코퍼러티브 익스텐션 시스템(Alabama Cooperative Extension System)은 균등한 기회를 실현하는 교육기관이자 고용기관 및 제공기관입니다. 2025년 8월 개정
© 2025년 앨라배마 코퍼러티브 익스텐션 시스템. 판권 소유. www.aces.edu ANR-2870-EE

www.aces.edu/go/growmore



QR 코드를 스캔하세요

