

甜玉米



阳光:种在阳光充足的地方(每天日照有 6 到 8 小时)。在每行内要间隔 8-12 英寸, 行与行之间的距离为 30-36 英寸。从三月中旬到五月下旬种植。

土壤:用有机物改良土壤, 打造出排水性良好的土壤。避免在未经改良的沙质土壤或重粘土土壤中种植。如果土壤测试结果显示 pH 值低于 6.2, 请按建议的方式加石灰。

水:请让土壤一直保持湿润, 但不要太潮湿。每周浇约 1-2 英寸水, 并且在夏季天热时多浇一些。避免把叶子打湿, 以便防止真菌病。覆盖物有助于保持水分。

种植:直接把种子播在一英寸深处。以 4 行一组的块状区域种植玉米, 以利于自花授粉。

种植
越多
给予越多

施肥:如果您没有做过土壤测试,请在种植时根据标签上的说明施用通用肥料(8-8-8或10-10-10)。植苗后4-6周时,在距离茎秆4-6英寸处(侧施肥料)进行追肥。

昆虫/疾病/杂草:经常检查植物有无受到虫害或疾病的影响。用杀虫皂(针对软体昆虫)或Bt粉或喷雾剂(针对毛毛虫或蠕虫)。经常喷洒杀菌剂,以便控制常见的真菌病。每次都请遵照标签上的说明。土壤覆盖物能抑制杂草及疾病。

采摘:当玉米穗中部的籽粒饱满且挤压时渗出白色乳浆时,即可采摘,通常在玉米吐丝后18至21天。采摘的时机因种类不同而异。

其他:玉米属于禾本科植物。它依靠风力为花朵授粉,因此最佳种植方式是采用短块状布局,而非长条形行列。

请访问 www.aces.edu/go/growmore 来了解更多信息。

种植
越多
给予越多

阿拉巴马州合作推广系统(阿拉巴马州农工大学和奥本大学)是机会均等的教育机构,雇主和提供者。2025年8月修订 © 2025年阿拉巴马州合作推广系统版权所有。保留所有权利。
www.aces.edu ANR-2876-HH

www.aces.edu/go/growmore



在这里扫描

