

网纹瓜 (麝香甜瓜)



阳光:种在阳光充足的地方(每天日照有 6 到 8 小时)。育苗时在每行内要间隔 24 英寸,或在每个 5-7 加仑大小的盆中种植 1 棵苗。在霜冻危险过去后的四月种植。

土壤:用有机物改良土壤,打造出排水性良好的土壤。避免在未经改良的沙质土壤或重粘土土壤中种植。如果土壤测试结果显示 pH 值低于 6.2,请在一月或二月按建议的方式加石灰。如果土壤测试结果显示 pH 值高于 6.2,请加一种 pH 值中性的钙补充剂,例如石膏。每株植物添加 ¼ 杯石膏以防止花开烂尾。

如果是在盆栽菜园中种植植物,请给每个花盆加 ¼ 杯石膏来改良土壤。如要确保排水情况良好,请使用花盆专用土并确保每个花盆都有排水孔。或者,您也可以考虑用自动吸水盆。

水:请让土壤一直保持湿润,但不要太潮湿。每周浇约 1-2 英寸水,并且在夏季天热时多浇一些。避免把叶子打湿,以便防止真菌病。覆盖物有助于保持水分。

种植:直接把种子播在壅起的土丘上 ½-1 英寸深处,以便保证排水情况良好。当苗长到 4-5 英寸高时进行间苗,每个土丘只留下 1-2 棵苗。如果植物长得太挤,它们会长不好或无法结出瓜来。不建议移栽。

种植
越多
给予越多

www.aces.edu/go/growmore

施肥:如果您没有做过土壤测试,请在种植时根据标签上的说明施用通用肥料(8-8-8 或 10-10-10)。当藤蔓开始蔓生时,在距离茎秆 4-6 英寸处(侧施肥料)植株旁进行追肥。

昆虫/疾病/杂草:经常检查植物有无受到虫害或疾病的影响。用杀虫皂(针对软体昆虫)或 Bt 粉或喷雾剂(针对毛毛虫或蠕虫)。经常喷洒杀菌剂,以便控制常见的真菌病。每次都请遵照标签上的说明。土壤覆盖物能抑制杂草及疾病。

采摘:在 80-100 天期间瓜蒂开始剥离时采摘。采摘的时机因种类不同而异。

其他:在香瓜将要成熟时请勿浇太多水,因为这样会降低香瓜的含糖量和风味。在瓜蒂半剥离(亦即瓜蒂与瓜半分开)时采摘。

请访问 www.aces.edu/go/growmore 来了解更多信息。

**种植
越多
给予越多**

阿拉巴马州合作推广系统(阿拉巴马州农工大学和奥本大学)是机会均等的教育机构、雇主和提供者。2025 年 8 月修订 © 2025 年阿拉巴马州合作推广系统版权所有。保留所有权利。
www.aces.edu ANR-2876-H

www.aces.edu/go/growmore



在这里扫描

