

# Melón (Cantalupo)



**Sol:** Siembre donde haya luz directa del sol (de 6 a 8 horas). Separe a unas 24 pulgadas a lo largo de hileras o coloque una planta en cada contenedor de 5 a 7 galones. Siembre en abril, después de que haya pasado cualquier peligro de helada.

**Suelo:** Acondicione con materia orgánica para crear un suelo bien drenado. Evite sembrar en suelo arenoso o muy arcilloso sin haberlo acondicionado. Si el análisis del suelo muestra que el pH es inferior a 6.2, aplique cal en enero o febrero y según las recomendaciones. Si el nivel de pH es superior a 6.2, aplique un suplemento de calcio a pH neutro, como el yeso. Añada  $\frac{1}{4}$  de taza de yeso por planta para evitar la podredumbre apical.

Si cultiva en contenedores, acondicione la tierra con  $\frac{1}{4}$  de taza de yeso. Para lograr un drenaje adecuado, utilice una mezcla para macetas y asegúrese de que los recipientes tengan agujeros de drenaje. También puede utilizar contenedores con autorriego.

**Agua:** Mantenga la tierra constantemente húmeda pero no saturada. Aplique entre 1 y 2 pulgadas de agua por semana y un poco más durante los días calurosos de verano. Mantenga las hojas secas para evitar enfermedades fúngicas. El mantillo ayuda a retener la humedad.

**Cultivo:** Cultive las semillas mediante siembra directa a entre  $\frac{1}{2}$  y 1 pulgada de profundidad en surcos elevados para garantizar un buen drenaje del suelo. Cuando los brotes tengan entre 4 y 5 pulgadas de altura, entresaque plantas hasta dejar solo 1 o 2 brotes por surco. Las plantas no crecerán bien ni producirán si se encuentran encimadas. No se recomienda trasplantar.

**Fertilizante:** Si no cuenta con un análisis del suelo, aplique un fertilizante multiuso (8-8-8 o 10-10-10) al momento de la siembra y según las indicaciones de la etiqueta. Vuelva a aplicarlo a un costado de la planta, a una distancia de entre 4 y 6 pulgadas del tallo (chorreado), cuando las vides comiencen a crecer.

**Insectos/Enfermedades/Maleza:** Explore las plantas con frecuencia en busca de daños causados por insectos y enfermedades. Utilice jabón insecticida para los insectos de cuerpo blando o polvo o espray Bt para las orugas, o gusanos. Rocíe fungicidas con frecuencia para eliminar las enfermedades fúngicas más comunes. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta. El mantillo inhibe las malas hierbas y las enfermedades.

**Cosecha:** Coseche entre los 80 y los 100 días, cuando la base del tallo de la fruta comience a separarse. El tiempo de cosecha dependerá de la variedad.

**Otros:** Evite regar la planta en exceso a medida que las frutas maduran, ya que esto reduce el contenido de azúcar y el sabor de la fruta. Coseche cuando el pedúnculo se agriete (cuando la mitad del tallo se haya separado de la fruta).

Visite [www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore) para saber más.

**CULTIVE  
MÁS  
DONE MÁS**

El Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama (Universidad A&M de Alabama y Universidad de Auburn) es un educador, empleador y prestador de servicios que promueve la igualdad de oportunidades. © 2025 por el Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama. Todos los derechos reservados.

[www.aces.edu](http://www.aces.edu) ANR-2876-H

[www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore)



ESCANEAR AQUÍ

