

Cebollas



Sol: Siembre donde haya luz directa del sol (de 6 a 8 horas). Separe de 2 a 4 pulgadas a lo largo de hileras o coloque de 3 a 4 plantas en cada contenedor de 2 a 3 galones. Siembre desde enero hasta marzo y desde septiembre hasta octubre.

Suelo: Acondicione con materia orgánica para crear un suelo bien drenado. Evite sembrar en suelo arenoso o muy arcilloso sin haberlo acondicionado. Si el análisis del suelo muestra que el pH es inferior a 6.2, aplique cal en octubre o en noviembre y según las recomendaciones. Para lograr un drenaje adecuado, si cultiva en contenedores, utilice una mezcla para macetas y asegúrese de que los recipientes tengan agujeros de drenaje. También puede utilizar contenedores con autorriego.

Agua: Mantenga la tierra constantemente húmeda pero no saturada. Aplique entre 1 y 2 pulgadas de agua por semana. Mantenga las hojas secas para evitar enfermedades fúngicas. El mantillo ayuda a retener la humedad.

Cultivo: Cultive las semillas mediante siembra directa a $\frac{1}{2}$ pulgada de profundidad. Siembre los trasplantes de cebolla (plantones) a $\frac{1}{4}$ de pulgada de profundidad. Si siembra en primavera, utilice los plantones en lugar de las semillas. Para las cebollas de bulbo grande, la separación mínima entre los trasplantes debe ser de al menos 2 pulgadas. Si compra trasplantes, elija los que tengan un color saludable y un aspecto fornido. El hoyo para plantarlos debe ser tan profundo como el cepellón o aún más. Aplane la tierra con firmeza y riegue mucho.

Fertilizante: Si no cuenta con un análisis del suelo, aplique un fertilizante multiuso (8-8-8 o 10-10-10) al momento de la siembra y según las indicaciones de la etiqueta. Vuelva a aplicarlo a un costado de las plantas, a una distancia de entre 4 y 6 pulgadas del tallo (chorreado), cuando los tallos tengan 6 pulgadas de altura.

Cuando las plantas de cebolla tengan unas 5 hojas, realice un chorreado con aproximadamente ½ taza de 15-0-15 por cada 10 pies de hilera.

Insectos/Enfermedades/Maleza: Explore las plantas con frecuencia en busca de daños causados por insectos y enfermedades. Utilice jabón insecticida para los insectos de cuerpo blando o polvo o espray Bt para las orugas, o gusanos. Rocíe fungicidas con frecuencia para eliminar las enfermedades fúngicas más comunes. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta. El mantillo inhibe las malas hierbas y las enfermedades.

Cosecha: Coseche entre los 40 y los 120 días. El tiempo de cosecha dependerá de la variedad.

Otros: Las cebollas verdes están listas cuando miden entre 6 y 8 pulgadas de altura. Las cebollas de bulbo están listas para la cosecha cuando los tallos se debilitan y doblan. Retírelas de la huerta y colóquelas en un lugar protegido para que se sequen durante 1 o 2 días. Tras el secado, retireles el tallo y las raíces y guárdelas en un lugar fresco y seco.

Visite www.aces.edu/go/growmore para saber más.



El Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama (Universidad A&M de Alabama y Universidad de Auburn) es un educador, empleador y prestador de servicios que promueve la igualdad de oportunidades. © 2025 por el Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama. Todos los derechos reservados. www.aces.edu ANR-2876-M

www.aces.edu/go/growmore



ESCANEAR AQUÍ

