

豌豆 (甜豌豆)



阳光:种在阳光充足的地方(每天日照有 6 到 8 小时)。植苗时在每行内要间隔 2 英寸,或在每个 5-7 加仑大小的盆中种植 1-2 棵苗。如果要在早春采收,请在二月种植。

土壤:用有机物改良土壤,打造出排水性良好的土壤。避免在未经改良的沙质土壤或重粘土土壤中种植。如果土壤测试结果显示 pH 值低于 6.2,请在十月或十一月按建议的方式加石灰。

在盆栽菜园中,请使用花盆专用土并确保每个花盆都有排水孔,以便保持良好的排水情况。或者,您也可以考虑用自动吸水盆。

水:请让土壤一直保持湿润,但不要太潮湿。每周浇约 1-2 英寸水。防止把叶子打湿,以便防止真菌病。覆盖物有助于保持水分。

种植:直接把种子播在靠近格子架或木桩 2 英寸深处。不建议移栽。

种植
越多
给予越多

www.aces.edu/go/growmore

施肥:如果您没有做过土壤测试,请在种植时施用通用肥料(8-8-8 或 10-10-10)。使用氮肥推荐量的三分之二,因为过多的氮会妨碍开花和结豆荚。

昆虫/疾病/杂草:经常检查植物有无受到虫害或疾病的影响。用杀虫皂(针对软体昆虫)或 Bt 粉或喷雾剂(针对毛毛虫或蠕虫)。经常喷洒杀菌剂,以便控制常见的真菌病。每次都请遵照标签上的说明。土壤覆盖物能抑制杂草及疾病。

采摘:在 60-70 天期间豆荚完全长成但颜色仍然碧绿时采摘。采摘的时机因种类不同而异。

其他:甜豌豆可以连皮吃,也可去皮后吃。在豆荚还很嫩时趁早采摘。在开花和结豆荚期间保持保持土壤水分均匀。

请访问 www.aces.edu/go/growmore 来了解更多信息。

**种植
越多
给予越多**

阿拉巴马州合作推广系统(阿拉巴马州农工大学和奥本大学)是机会均等的教育机构、雇主和提供者。2025 年 8 月修订 © 2025 年阿拉巴马州合作推广系统版权所有。保留所有权利。
www.aces.edu ANR-2876-O

www.aces.edu/go/growmore



在这里扫描

