

# Berenjena



**Sol:** Siembre donde las semillas tengan luz directa del sol (de 6 a 8 horas). Separe las semillas de 24 a 36 pulgadas a lo largo de hileras o coloque 2 plantas en cada contenedor de 5 galones. Siembre desde mediados de abril hasta mediados de mayo y en julio.

**Suelo:** Acondicione con materia orgánica para crear un suelo bien drenado. Evite sembrar en suelo arenoso o muy arcilloso sin haberlo acondicionado. Si el análisis del suelo muestra que el pH es inferior a 6.2, aplique cal según las recomendaciones.

Para lograr un drenaje adecuado, si cultiva en contenedores, utilice una mezcla para macetas y asegúrese de que los recipientes tengan agujeros de drenaje. También puede utilizar contenedores con autorriego.

**Agua:** Mantenga la tierra constantemente húmeda pero no saturada. Aplique entre 1 y 2 pulgadas de agua por semana y un poco más durante los días calurosos de verano. Mantenga las hojas secas para evitar enfermedades fúngicas. El mantillo ayuda a retener la humedad.

**Cultivo:** Comience a armar los plantones de interior de 3 a 4 semanas antes de la siembra y, una semana antes, prepárelos lentamente para trasplantarlos en el jardín. Si compra trasplantes, elija los que tengan un color saludable y un aspecto fornido. Evite aquellos que tengan flores. El hoyo para plantarlos debe ser tan profundo como el cepellón. Aplane la tierra con firmeza y riegue mucho.

**Fertilizante:** Si no cuenta con un análisis del suelo, aplique un fertilizante multiuso (8-8-8 o 10-10-10) al momento de la siembra y según las indicaciones de la etiqueta. Aplique nitrógeno a una distancia de entre 4 y 6 pulgadas del tallo (chorreado), entre 4 y 6 semanas luego de la siembra.

**Insectos/Enfermedades/Maleza:** Explore las plantas con frecuencia en busca de daños causados por insectos y enfermedades. Utilice jabón insecticida para los insectos de cuerpo blando o polvo o espray Bt para las orugas, o gusanos. Rocíe fungicidas con frecuencia para eliminar las enfermedades fúngicas más comunes. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta. El mantillo inhibe las malas hierbas y las enfermedades.

**Cosecha:** Coseche entre los 65 y 85 días del trasplante, cuando los frutos tengan entre 4 y 6 pulgadas de diámetro y estén firmes y sean de un color vivo. El tiempo de cosecha dependerá de la variedad.

**Otros:** La berenjena es sensible a los suelos fríos y a las heladas.

Visite [www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore) para saber más.

**CULTIVE  
MÁS  
DONE MÁS**

El Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama (Universidad A&M de Alabama y Universidad de Auburn) es un educador, empleador y prestador de servicios que promueve la igualdad de oportunidades. © 2025 por el Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama. Todos los derechos reservados. [www.aces.edu](http://www.aces.edu) ANR-2876-Y

[www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore)



ESCANEAR AQUÍ

