

# 南瓜 (夏季)



**阳光:** 种在阳光充足的地方 (每天日照有 6 到 8 小时)。育苗时在每行内要间隔 15 至 24 英寸, 或在一个 5 至 7 加仑大小的盆中种植 1 棵苗。从四月到七月在所有霜冻危险过去后种植。

**土壤:** 用有机物改良土壤, 打造出排水性良好的土壤。避免在未经改良的沙质土壤或重粘土土壤中种植。如果土壤测试结果显示 pH 值低于 6.2, 请在早春按建议的方式加石灰。如果土壤测试结果显示 pH 值高于 6.2, 请加一种 pH 值中性的钙补充剂, 例如石膏。每株植物添加  $\frac{1}{4}$  杯石膏以防止花开烂尾。

如果是在盆栽菜园中种植植物, 请给每个花盆加  $\frac{1}{4}$  杯石膏。如要确保排水情况良好, 请使用花盆专用土并确保每个花盆都有排水孔。您也可以使用自动吸水盆。

**水:** 请让土壤一直保持湿润但不要太潮湿。每周浇约 1 到 2 英寸的水, 在炎热的夏季可以多浇一些。让叶子保持干燥, 以便防止真菌病。覆盖物有助于保持水分。

**种植:** 直接把种子播种在 1 英寸深处且相距 24 英寸。当苗长到 4 到 5 英寸时进行间苗, 使之相距 12 英寸。如果植物长得太挤, 它们会长不好或无法结出瓜来。不建议移栽。

**施肥:** 如果您没有做过土壤测试,请在种植时并根据标签上的说明施用通用肥料 (8-8-8 或 10-10-10)。当植物长到 8-10 英寸时再洒在离茎秆 4-6 英寸处 (侧施肥料)。

**昆虫/疾病/杂草:** 经常检查植物有无受到虫害或疾病的影响。用杀虫皂 (针对软体昆虫) 或 Bt 粉或喷雾剂 (针对毛毛虫, 也称为“蠕虫”)。经常喷洒杀菌剂, 以便控制常见的真菌病。每次都请遵照标签上的说明。土壤覆盖物能抑制杂草及疾病。

**收割:** 第 35-40 天时可进行采摘。采摘的时机因瓜的种类不同而异。

**其他:** 夏南瓜是大棵的植物, 通常种在壅土的垄中, 间隔 15-36 英寸 (如果空间允许的话, 最好间隔 36-48 英寸), 以确保排水情况良好。请访问 [www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore) 来了解更多信息。

**种植  
越多  
给予越多**

阿拉巴马州合作推广系统 (阿拉巴马州农工大学和奥本大学) 是机会均等的教育机构、雇主和提供者。2025 年 8 月修订 © 2025 年阿拉巴马州合作推广系统版权所有。保留所有权利。  
[www.aces.edu](http://www.aces.edu) ANR2376-C

[www.aces.edu/go/growmore](http://www.aces.edu/go/growmore)



在这里扫描

