

브로콜리



햇빛 세기: 일조량이 풍부한 맑은 날에 심습니다(6~8시간 직사광선을 받는 곳이어야 함). 18인치 간격으로 나란히 심어야 하며, 버킷에 심는다면 5~7갤런 부피 버킷당 1그루가 적당합니다. 8월 초에 심으세요.

토양 상태: 유기물을 섞어 물 빠짐을 좋게 합니다. 개량되지 않은 모래나 중점토에 심지 않도록 합니다. 토양 검사를 실시했고 산도(pH)가 6.2 미만으로 나왔다면, 5월 또는 6월에 석회질 비료를 권장량만큼 뿌려줍니다.

버킷 텃밭의 물 빠짐을 좋게 하려면 분갈이 배합토를 사용하고 버킷에 배수 구멍이 뚫려 있어야 합니다. 자체적인 물 주기 기능이 있는 화분도 좋습니다.

물 주기: 토양의 수분을 일정하게 유지하되, 수분이 너무 많아서도 안 됩니다. 매주 1~2인치 깊이 정도로 물을 줍니다. 잎이 건조해야 곰팡이병을 예방할 수 있습니다. 멀칭을 하면 수분 유지에 도움이 됩니다.

심기: 싹을 틔워 6주간 키운 다음, 1주간 실외에 내놓아 외부 환경에 서서히 적응시킨 후 텃밭에 옮겨 심습니다. 모종을 구매해서 심는 경우, 색깔이 선명하고 튼튼하게 보이는 것으로 고릅니다. 꽃이 핀 모종은 피하도록 합니다. 분형근(root ball)이 완전히 덮일 정도의 깊이 구덩이를 팍니다. 흙을 두드려서 모종을 단단히 고정시키고 물을 흘낏 줍니다.

비료 주기: 토양 검사를 하지 않을 경우, 모종을 심으면서 복합 비료(all-purpose fertilizer, 8-8-8 또는 10-10-10 혼합 비율)를 제품 표기량에 맞게 뿌려줍니다. 심고 나서 3~4주쯤, 줄기에서 4-6인치(가까이) 둘레로 질산 칼슘을 소량 뿌려줍니다. 질산칼슘을 뿌리면 성장을 촉진할 수 있습니다. 브로콜리 봉오리들이 나기 시작하면 질소를 한 번 더 뿌려줍니다.

병충해 및 잡초 관리: 병충해 관리를 자주 해 줘야 생리장애를 막을 수 있습니다. 살충 비누(insecticidal soap(연조직 곤충용)) 또는 분말이나 스프레이 형태의 BT제(애벌레 등 해충 방지에 효과적인 농약)를 사용하고, 주요 병해 방제를 위해 살진균제를 정기적으로 뿌려주세요. 제품 설명문을 항상 준수해야 합니다. 멀칭을 하면 잡초와 병충해를 방지할 수 있습니다.

수확: 꽃이 피고 노란색을 띠기 전인 55~75일 사이에 수확합니다. 품종에 따라 수확 시기가 다릅니다.

그 외 정보: 브로콜리 수확 시 가운데 줄기를 가능한 한 많이 남겨 두면 작은 브로콜리 봉오리들이 옆으로 퍼져 자라게 만들 수 있습니다.

더 자세한 정보는 www.aces.edu/go/growmore에서 확인하세요.

QR 코드를 스캔하세요



그로우
모어
기브 모어

앨라배마 A&M 대학교와 오번 대학교의 앨라배마 코퍼러티브 익스텐션 시스템(Alabama Cooperative Extension System)은 균등한 기회를 실현하는 교육기관이자 고용기관 및 제공기관입니다. 2025년 8월 개정
© 2025년 앨라배마 코퍼러티브 익스텐션 시스템. 판권 소유. www.aces.edu ANR-2876-F

www.aces.edu/go/growmore



extension
ALABAMA A&M AND AUBURN UNIVERSITIES