

Brócoli



Sol: Siembre donde las semillas tengan luz directa del sol (de 6 a 8 horas). Separe las semillas unas 18 pulgadas a lo largo de hileras o coloque una planta en cada contenedor de 5 a 7 galones. Siembre a principios de agosto.

Suelo: Acondicione con materia orgánica para crear un suelo bien drenado. Evite sembrar en suelo arenoso o muy arcilloso sin haberlo acondicionado. Si el análisis del suelo muestra que el pH es inferior a 6.2, aplique cal en mayo o en junio y según las recomendaciones.

Para lograr un drenaje adecuado, si cultiva en contenedores, utilice una mezcla para macetas y asegúrese de que los recipientes tengan agujeros de drenaje. También puede utilizar contenedores con autorriego.

Agua: Mantenga la tierra constantemente húmeda pero no saturada. Aplique entre 1 y 2 pulgadas de agua por semana. Mantenga las hojas secas para evitar enfermedades fúngicas. El mantillo ayuda a retener la humedad.

Cultivo: Comience a armar los plantones de interior 6 semanas antes de la siembra y, una semana antes, prepárelos lentamente para trasplantarlos en el jardín. Si compra trasplantes, elija los que tengan un color saludable y un aspecto fornido. Evite aquellos que tengan flores. El hoyo para plantarlos debe ser tan profundo como el cepellón. Aplane la tierra con firmeza y riegue mucho.

Fertilizante: Si no cuenta con un análisis del suelo, aplique un fertilizante multiuso (8-8-8 o 10-10-10) al momento de la siembra y según las indicaciones de la etiqueta. Para estimular el crecimiento, aplique una pequeña cantidad de nitrato de calcio a un costado de las plantas, a una distancia de entre 4 y 6 pulgadas del tallo (chorreado), 3 o 4 semanas luego de la siembra. Vuelva a aplicarlo cuando comiencen a aparecer las cabezas.

Insectos/Enfermedades/Maleza: Explore las plantas con frecuencia en busca de daños causados por insectos y enfermedades. Utilice jabón insecticida para los insectos de cuerpo blando o polvo o espray Bt para las orugas, o gusanos. Rocíe fungicida con frecuencia para eliminar las enfermedades fúngicas más comunes. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta. El mantillo inhibe las malas hierbas y las enfermedades.

Cosecha: Coseche entre los 55 y los 75 días, antes de que las flores se abran y se pongan amarillas. El tiempo de cosecha dependerá de la variedad.

Otros: Cuando coseche las cabezas de brócoli, deje la mayor cantidad de tallo central posible para estimular el crecimiento de las cabezas laterales más pequeñas.

Visite www.aces.edu/go/growmore para saber más.



El Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama (Universidad A&M de Alabama y Universidad de Auburn) es un educador, empleador y prestador de servicios que promueve la igualdad de oportunidades. Revisado en agosto de 2025. © 2025 por el Sistema de Extensión Cooperativa de Alabama. Todos los derechos reservados.
www.aces.edu ANR-2876-F

www.aces.edu/go/growmore



AUBURN



ESCANEAR AQUÍ

